

DESCRIPTION

DE

Quelques espèces nouvelles de Coléoptères de Syrie,

Par M. AUGUSTE CHEVROLAT.

(Séance du 12 Mars 1873.)

Le fils de M. Blanche, vice-consul de Syrie à Tripoli, m'a fait don récemment de quelques insectes uniques provenant de ses chasses dans cette partie de l'Asie-Mineure. Afin d'encourager ce jeune entomologiste, je crois devoir publier quelques-unes des espèces les plus intéressantes que j'ai reçues de lui.

1. *PACHYDEMA LANATA*. — Flava, nitida, minute et crebre punctata infraque lanugine longa vestita. Caput declive, minute creberrime rugoque punctatum cum limbo verticali læve, clypeo rotundato reflexo, ore valde piloso, clava antennari longa. Prothorax transversus, antice emarginatus, postice subarcuatus, lateribus rotundatus, pilis albis fimbriatus, marginibus angustissime sulcatus, minute et dense punctulatus; scutellum cordiforme, læve. Elytra singulatim rotundata, in sutura obtuse rectangulari, crebre minute ruguloseque punctata, stria suturali modice impressa, costulis duabus longitudinalibus obsoletis interna gemina. Pedes breves, femoribus crassis valde lanuginosis, tibiis anticis extus medio bidentatis, posticis brevibus, rubris postice ampliatis apice truncatis; tarsis. Propygidio punctato; pygidio orbiculari nitido, modice punctulato.

Longit. 15 mill., lat. 9 mill.

Syria.

Colore affinis *P. Saulcyi* at multo major, clypeo rotundato, etc.

2. *PIMELIA PUBERULA*. — Orbiculata, nigra puberula, in prothorace granulis minutis et in elytris granulis majoribus subcontiguis vestita, lateribus corporis longis pilis nigris indutis. Caput subnitidum minute et

dense punctatum et coriaceum posticeque minute granulosum, antice semi-arcuate emarginatum, inter oculis sulco transverso obsoleto signatum, clypeo transversali subquadrato antice emarginato, tomento rubro marginato, antennis parce pilosis, articulo tertio longitudine tribus sequentibus. Prothorax transversus, antice rectus in limbo nitidus, post oculos marginatus et in margine sulcatus, postice bisinuatus, supra scutellum intra emarginatus, lateribus rotundatis dorso convexus, linea longitudinali obsoleta; scutellum opacum, parvum rotundatum. Elytra orbiculata. Pedes breves, valde granulosi, infra longe nigro villosi.

Longit. 16 mill., lat. 10 1/4 mill.

Syria.

Affinis *P. Miltrei*; differt elytris haud costatis.

3. GONOCEPHALUM ANGUSTATUM. —Elongatum attenuatum piceum dense punctatum rugulosum. Caput rotundatum antice semi-circuiter emarginatum et marginatum, dein depressum, punctatum, costa transversali arcuata. Prothorax transversus, basi attenuatus, antice late emarginatus, postice rectus, lateribus antice rotundatus, angulis quatuor acutis, crebre punctatus piceus, in margine laterali luteus et anguste marginatus linea longitudinali angusta. Elytra parallela, conjunctim rotundata, striato-punctata, stria scutellari breve, striis duabus suturalibus paululum impressis, interstitiis punctulatis. Pedes flavi.

Longit. 5 mill., lat. 2 1/3 mill.

Syria.

4. MALACHIUS NITIDICOLLIS. —Parvus, elongatus, longitudine convexus, capite convexiusculo, prothoraceque nitido, viridibus, elytris angustis cœruleis macula rotundata apicali læte flava in singulo, pedibus nigris. Capite antice rotundato, linea longitudinali nitida et elevata signato, utrinque depressa minutissime punctulato. Antennis tribus primis articulis ferrugineis, sequentibus nigris quarto paululum dilatato. Prothorace elongato, antice semi-cylindrice truncato, postice recto, lateribusque reflexo, minutissime punctata, foveis duobus dorsalibus elongatis et foveola punctiformi in medio basis; scutello nitido. Elytris singulatim bilineolatis.

Longit. 3 mill., lat. 1 3/4 mill.

Syria (Tripoli).

5. PTINUS COMPTUS ♂. —Elongatus, pallide fulvus. Capite tomento

albido tectus, sulco antice brevi. Antennis linearibus articulis elongatis, secundo nodoso (quarto ad apicem longitudine crescentibus; oculis parvis, rotundatis nigris. Prothorace antice globoso, marginato, infra marginem transversim constricto, supra trinodoso (nodulo centrali elongato) pilis erectis villosis, postice profundius constricto, arcuatim protenso et marginato; scutello parvo, rotundato albido. Elytris parallelis, attamen versus apicem paululum latioribus, longitudine convexis, singulatim rotundatis, parce villosis, punctato-striatis (punctis striarum regularibus subcontiguis) callo humerali parvo elevato. Corpore infra pallidior, in medio abdominis sulco longitudinali; femoribus elongatis clavatis luteis.

Longit. 3 1/2 mill., lat. 1 3/4 mill.

Syria (Tripoli).

6. *CISTELA IMPRESSICOLLIS*. — Elongata flava, palpis, antennis (articulis 2 primis flavis) oculisque nigris, genuas et tarsis nigricantibus. Caput elongatum, antice recte truncatum, inter antennis late depressum. Prothorax latus, subquadratus, antice semi-circuiter emarginatus, basi recte truncatus, lateribus anticis rotundatus, sulco longitudinali angusto, foveis duabus basalibus elongatis et profundis et in medio basis nodulis duobus transversis. Scutellum triangulare, apice obtusum, transverse sulcatum. Elytra basi truncata, extus rotundata obsolete et angustime striata. Corpus infra flavum.

Longit. 6 mill., lat. 3 mill.

Syria.

7. *ANONCODES VERSICOLOR*. — Elongata rubra, capite elytris et pectore cœruleis, ore, scutello geniculis tarsisque nigris. Capite minutissime punctulato, inter antennis lineis duabus in fronte connexis, angulatis, clypeo flavo. Antennis cinereis apice rufis, tantum primo articulo nigro. Prothorace antice transversim constricto et angustius in basi. Elytris parallelis, in humero alte sed in apice angustius rotundatis, singulatim bilineatis, geniculis; tibiis in apice tarsisque nigricantibus.

Longit. 10 1/2 mill., lat. 3 mill.

Syria (Tripoli).

8. *DORCADION APICALE*. — Elongatum atrum nitidum fere læve, minute punctatum, caput antice planum punctulatum longitudinale tenue sulca-

tum, antennarum articulis basalibus (septem) crassis, secundo minutissimo. Prothorax transversus antice recte truncatus postice subarcuatus, reflexus et sulcatus, in medio laterali obtuse angulatus. Scutellum parvum triangulare. Elytra elongata oblonga, lateribus marginata et evidentius densiusque punctulata, in margine apicali rubida. Pedes elongati femoribus sat validis, pube tenue alba infra limbatis; tibiis posticis curvatis, versus apicem sensim incrassatis; tarsis latis, posticis elongatis; segmentis abdominalibus in margine postice nitidis. ♂.

Longit. 12 mill., lat. 5 mill.

Syria, Tripoli.

9. ADIMONIA TRIPOLIANA. — Supra rufa crebre punctata infra nigra dense punctata. Caput convexum, nigrum, crebre punctatum, coriaceum, longitudine sulcatum; antennis articulis 2 basalibus nigris, alteris cinereis. Prothorax transversus rufo-obscurus, antice posticeque rectus, lateribus rotundatis modice reflexis, rufis, supra ruge punctatus, sulco dorsali integro. Scutellum rotundatum punctatum, medio impressum. Elytra costis sex nigris, secunda ad humeralem et quarta ad quintam apice junctis, prima suturali et tertia minus elevatis. Epipleuris rufis. Corpus infra pedesque nigra, dense punctata, pube brevi cinerea vestita.

Long. 9 mill., lat. 6 mill.

Syria, Tripoli.

Affinis *A. jucundæ*, sed in typo speciei, margo prothoracis omnino flavo marginatus, elytraque apice minus ampliata.

10. TIMARCHA AMETHYSTIPES. — Atra, subnitida vage et vix conspicue punctulata. Caput distinctius punctulatum, antice truncatum, depressione antica triangulari, lateribus sulcata cum sulco verticali angusto; antennis basi violaceis (articulis 6) apice nigris. Prothorax antice emarginatus, postice rectus, lateribus anticis ampliatus et rotundatus, marginibus angustissime sulcatus, angulis posticis rectangulis. Scutellum transversum, subtriangulare. Elytra globosa, lateribus marginata. Epipleuris æqualibus obliquis. Corpus infra nigrum, minutissime punctulatum. Pedibus amethystinis. ♀.

Longit. 17 mill., lat. 11 mill.

Syria, Tripoli.

